



Eritetahrat aiheuttavat tartuntavaaran,
siksi ne on poistettava heti.

YKSI VAIHEINEN

eritetahradesinfektio

- 1. Käytä** kertakäyttöisiä suojakäsineitä.
- 2. Kaada** eritetahrän päälle runsas määrä desinfektioainetta niin, että se peittyi kokonaan.
- 3. Pyyhi** alue puhtaaksi kertakäyttö- / paperipyyhkeellä ja laita käytetty pyyhe jätepussiin.
- 4. Riisu** käyttämäsi suojakäsineet ja laita ne jätastiaan.
- 5. Desinfioi** kätesi Erisan Käsihuuhteella.



- | | |
|-----------------|--------------------------|
| Klorilli | ☐ |
| 5000 ppm (25 %) | |
| Erisan Oxy+ | ☐ |
| 5 % | |
| Erisan Des | ☐ |
| 5 % | |
| Desichlor | ☐ |
| 5000 ppm (25 %) | |



Eritetahrat aiheuttavat tartuntavaaran,
siksi ne on poistettava heti.

KAKSIVAIHEINEN

eritetahradesinfektio

- 1. Käytä** kertakäyttöisiä suojäkäsineitä.
- 2. Imeytä** erite kertakäyttö- / paperipyyhkeeseen.
- 3. Laita** käytetty pyyhe sekä käsine jätepussiin.
- 4. Laita** käteen uusi kertakäyttökäsine.
- 5. Kostuta** puhdas kertakäyttö- / paperipyyhe desinfektioaineella ja pyyhi tahriintunut alue puhtaaksi.
- 6. Laita** käytetty pyyhe sekä käsine jätepussiin.
- 7. Desinfioi** kätesi Erisan Käsihuuhteella.



☐ **Klorilli**
500-1000 ppm
(3-5 %)



☐ **Erisan Oxy+**
2 %



☐ **Erisan Des**
2 %



☐ **Easydes**
käyttövalmis



☐ **Tevan Panox® 200**
käyttövalmis



☐ **Desichlor**
500-1000 ppm
(3-5 %)